

Режим введения инсулина определяется врачом в зависимости от назначаемого вида инсулина


1 Аналог инсулина сверхдлительного действия

Аналоги инсулина сверхдлительного действия вводятся 1 раз в сутки. Сверхдлительное действие дает возможность введения в гибком режиме в течение суток, исходя из потребностей пациента. Последнее означает, что Вы можете перенести инъекцию на более раннее/позднее время, если применение препарата в рекомендуемые часы невозможно. При этом интервал между инъекциями должен быть не менее 8 часов и не более 40 часов.




2 Аналог инсулина длительного действия

Аналоги инсулина длительного действия, как правило, вводятся 1–2 раза в день в любое время дня, но каждый день в одно и то же время. Аналог длительного действия до 36 часов, при необходимости, позволяет проводить инъекцию в течение 3 часов до или 3 часов после обычного для них времени ее проведения.



3 Человеческий инсулин средней продолжительности действия (НПХ)

Как правило, инсулин НПХ используют 2 раза в день утром и вечером. Это связано с тем, что препараты данного вида действуют в течение 12–16 часов. Необходимо соблюдать строгий режим введения инсулина: 2 раза в день, ежедневно в четко определенное время (как правило, интервал между инъекциями составляет 12 часов).



1. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / Под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова, 8-й выпуск, 2017 год. 2. Сахарный диабет 1 типа: реалии и перспективы / Под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой. - М., 2016. Подготовлено по материалам книги: Сахарный диабет 1 типа: руководство для пациентов. / А.Ю. Майоров, Е.В. Суркова, О.Г. Мельникова. - М.: Фарм-Медиа, 2016. - 120 с. Сахарный диабет 2 типа: руководство для пациентов. / Е.В. Суркова, А.Ю. Майоров, О.Г. Мельникова. - М.: Фарм-Медиа, 2016. - 116 с.